

Voltaren

Emulgel Forte

Diclofenaco Dietilamina 2,32% Gel



12 Horas

Alivio del dolor muscular y articular hasta por 12 horas
Alivio prolongado del dolor y la inflamación



Lea detenidamente este inserto antes de utilizar el producto ya que contiene información importante para usted.

Siempre use este producto exactamente como está descrito en el inserto o como el profesional de la salud le indique.

Conserve esta información, podría necesitar leerla nuevamente.

Consulte a su profesional de la salud si tiene alguna duda o necesita más información.

COMPOSICION

Cada 100 g contienen: Diclofenaco dietilamina 2,32 g equivalente a diclofenaco sódico 2 g.

Los excipientes son: Butilhidroxitolueno, carbómero, caprilocaprato de cocoilo, dietilamina, alcohol isopropílico, parafina líquida, éter cetosteárico de macrogol, alcohol oléico, propilenglicol, perfume de eucalipto, agua purificada.

Voltaren Emulgel Forte es un gel de apariencia cremosa blanco a blanuzco, refrescante, no grasoso y que no mancha.

PROPIEDADES / INDICACIONES

Su principio activo es diclofenaco, el cual pertenece a una clase terapéutica que se denomina «antiinflamatorios no esteroideos» (AINEs). Está especialmente diseñado para frotarlo sobre la piel mejorando su permeabilidad. Actúa en tejidos inflamados profundos. Se utiliza para aliviar el dolor, reducir la inflamación y edema en un número de condiciones dolorosas que afectan las articulaciones y los músculos.

Puede ser usado para tratar:

- Lesiones de músculos y articulaciones, por ejemplo: golpes, contusiones, esguinces, dolor de espalda y lesiones deportivas, aliviando el dolor rápidamente incluyendo el dolor moderado a fuerte, mejorando la movilidad del paciente y ayudando a recuperar la función normal.
- Tendinitis (por ejemplo, codo del tenista), inflamación alrededor del codo o rodilla.
- Artritis moderada de rodilla y dedos.

DOSIS / MODO DE EMPLEO

Vía de administración: Tópica.

Adultos y adolescentes de 12 años y mayores: Aplique frotando suavemente 2 veces al día en el área del dolor o área inflamada, para un alivio prolongado hasta por 12 horas. La cantidad necesaria dependerá del tamaño de la zona con dolor o inflamada; una cantidad equivalente al tamaño de una cereza o al de una nuez será suficiente. Lave sus manos luego de la aplicación, a menos que estas sean el sitio por tratar.

Únicamente para uso externo.

No lo use en niños menores de 12 años. Siempre use la menor dosis efectiva y durante el tiempo más corto.

No usar el producto por más de 2 semanas en casos de lesiones en músculos y articulaciones (por ejemplo: golpes, contusiones y esguinces) o tendinitis, y por más de 3 semanas en casos de dolor artrítico sin consultar a un médico o farmacéutico.

Si el dolor o la inflamación no mejoran dentro de los 7 días o si éstos empeoran, consulte con su médico.

CONTRAINDICACIONES

No debe usar el producto si:

- Es alérgico al diclofenaco u otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos usados para tratar dolor, fiebre o inflamación, tales como ibuprofeno o aspirina, o cualquiera de los ingredientes que contiene este medicamento. Si no está seguro, consulte a su médico o farmacéutico.
- Los síntomas de una reacción alérgica a estos medicamentos pueden incluir: sibilancias o dificultad para respirar (asma); erupciones en la piel con ampollas o urticaria; inflamación de la cara o lengua y flujo nasal.
- Está dentro de los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No aplique en la piel con cortadas, heridas abiertas o que presenta erupciones, o eczema. Suspenda el tratamiento si se desarrollan erupciones en la piel luego de la aplicación del producto. No use más producto del indicado o por un periodo de tiempo más prolongado, a menos que su médico se lo recomiende.

No lo use en la boca, no ingerir y lavar las manos después de aplicarlo, a menos que éstas sean el sitio por tratar. Evite la aplicación en los ojos, si esto ocurre, debe lavarlos con abundante agua limpia y consultar con su médico o farmacéutico si persiste alguna molestia.

Se puede usar con aparatos ortopédicos o vendajes empleados comúnmente para lesiones como esguinces, pero no lo use debajo de vendas herméticas (plásticas). La formulación contiene propilenglicol el cual puede causar irritaciones localizadas leves en la piel de algunas personas, ybutilhidroxitolueno que puede causar reacciones locales en la piel, por ejemplo, dermatitis de contacto o irritación en los ojos y membranas mucosas.

EMBARAZO, FERTILIDAD Y LACTANCIA

- Si está embarazada o en período de lactancia, cree que puede estar embarazada o está planeando tener un bebé, úselo únicamente bajo previo consejo de su médico.
- No usar durante los últimos 3 meses de embarazo, ya que podría afectar al feto o causar problemas durante el parto.

REACCIONES ADVERSAS

Al usar este producto puede experimentar: Erupciones en la piel con o sin ampollas; urticaria; sibilancias, dificultad para respirar o sensación de opresión en el pecho (asma); inflamación de la cara, labios, lengua o garganta; enrojecimiento o picazón de la piel.

La piel puede ser más sensible a la luz solar (sol o cabina de bronceado). Los posibles signos son quemaduras solares con picazón, hinchazón y ampollas.

INTERACCIONES

Informe a su médico o farmacéutico antes de usar si está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier medicamento habitual en productos de venta con o sin prescripción médica.

SOBREDOSIS

Si ingiere este medicamento consulte a su médico inmediatamente.

COMENTARIOS ESPECIALES

- Conservar a una temperatura no mayor a 30°C.
- No utilice el producto después de la fecha de expiración que se indica en el tubo y la caja.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS

Presentación autorizada para Ecuador: 100 g.
Fabricado por: GSK Consumer Healthcare S.A., Route de L'Etraz 2, 1260 Nyon, Suiza
Fecha de la última revisión: Versión 03 (Mayo de 2018)
GDS/GCI Topical Diclofenac V 3.0.

Marcas propiedad de o licenciadas al grupo de compañías GSK. ©2019 GSK o licenciante

NPA002272